

## Round 1, Question 1

- Il glatiramer acetato è efficace per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente?
- Come si confronta con l'interferone beta?

## Round 1, Question 2

Quale antibiotico è piu' efficace/appropriato per il trattamento della cistite acuta in una donna gravida?

## Round 1, Question 3

- Quale è la dose corretta di famciclovir per il trattamento dello Zoster in un paziente immunocompetente?

## Round 1, Question 4

- L'applicazione delle calze graduate di compressione come profilassi meccanica per ridurre il rischio di tromboembolia venosa è efficace per i pazienti che hanno avuto ictus acuto?

## Round 1, Question 5

- Hai un nuovo paziente che è un adolescente con disturbo ossessivo-compulsivo. I suoi genitori affermano che ciò è dovuto al mal di gola. Quali sono i criteri diagnostici per il Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric disorder associato all'infezione da streptococco (PANDAS)?

## Round 1, Question 6

- Come diagnostichereste la sindrome da stanchezza cronica?

## Round 1, Question 7

- Un paziente maschio di 45 anni lamenta dispnea da 2 ore con inizio improvviso. Il paziente ha effettuato due giorni fa' un volo intercontinentale in aereo durato 12 ore.
- Nella anamnesi non appare storia di tromboembolia, cancro o altre patologie mediche.
- Ha tachicardia (polso a 106 battiti per minuto) ma, a parte questo, risulta normale all'esame fisico.
- **Come classifichereste il rischio di embolia polmonare (alto, intermedio o basso?)**

## Round 1, Question 8

- Quale percorso diagnostico percorrereste per un paziente con rischio intermedio di embolia polmonare? Considerate le risorse disponibili per la diagnosi del Vostro ambiente

## Round 1, Question 9

- E' piu' efficace la combinazione trifusal + aspirina oppure cilostazol + aspirina per la prevenzione secondaria di ictus in pazienti con una storia pregressa di attacchi ischemici transitori?

## Round 1, Question 10

- Quale è l'antibiotico piu' efficace per il trattamento della infezione non complicata sintomatica delle vie urinarie in paziente di sesso femminile?

## Round 2, Question 1

- Una bimba di 3 anni dal peso di 13,3 kg è affetta da gastroenterite da rotavirus e disidratazione moderata.
- Come iniziate la reidratazione?

## Round 2, Question 2

- Paziente di sesso maschile lamenta una improvvisa perdita dell'udito neurosensoriale.
- Decidete di prescrivere degli steroidi.
- Dovreste anche includere una terapia antivirale come parte del piano di cura?

## Round 2, Question 3

- State creando un protocollo per definire la risposta ai pazienti che sviluppano anafilassi nel vostro ospedale.
- Vi sono medici che ritengono che la epinefrina possa essere somministrata per via subcutanea invece che per via intramuscolare.
- C'è una differenza in termini di efficacia tra le due modalità di somministrazione?

## Round 2, Question 4

- State valutando un bimbo di 22 mesi in follow up dopo trattamento di una infezione delle vie urinarie. Il bimbo soffre di reflusso vescico-ureterale di II grado
- Dovreste iniziare a somministrare anche un antibiotico per la profilassi?
- Se si, quale antibiotico?

## Round 2, Question 5

- Come diagnosticare la sindrome da colon irritabile?
- Quale valutazione è appropriata ed in linea con le migliori raccomandazioni?

## Round 2, Question 6

- Paziente donna di 70 anni
- Ha palpitazioni
- Episodi di fibrillazione atriale
- Unico fattore di rischio cardiovascolare è ipertensione curata con farmaci anti-ipertensivi
- Ecocardiogramma mostra funzione ventricolo sinistro normale e nessun segno di cardiopatia valvolare

Come gestireste questo paziente?

Prescrivereste farmaci anticoagulanti? Se si quali?

## Round 2, Question 7

- I farmaci anti-ipertensivi riducono i rischi cardiovascolari in pazienti con ipertensione moderata (145/95 mmHg) e nessun altro fattore di rischio cardiovascolare?

## Round 2, Question 8

- Paziente di 25 anni con Morbo di Crohn - induzione della remissione per via chirurgica.
- Quale è il trattamento piu' appropriato per il mantenimento della remissione?

## Round 2, Question 9

- Paziente di sesso femminile.